

HYPER

GLYCEMIE < / ...

vermoeidheid



vaak
plassen



droge tong



dorst



slaperigheid




HYPO

GLYCEMIE > / ...




Bij ernstige hypoglycemie: **glucagon**




Wie kan de inspuiting geven?

Wanneer de persoon met diabetes nood heeft aan GlucaGen®, is hij/zij niet in staat dit zelf toe te dienen: hij/zij is bewusteloos. GlucaGen® kan geïnjecteerd worden **door iedereen, ook iemand zonder ervaring met inspuiten**. Het is aanbevolen om te injecteren in de spieren van de dij.


Hoe de inspuiting geven?




1. Verwijder de oranje plastic dop van de flacon en spuit **al** de vloeistof van de spuit in de flacon.



2. Zonder de naald uit de flacon te verwijderen, de flacon lichtjes schudden totdat GlucaGen® volledig opgelost is en de oplossing helder is.



3. Zuig de hele oplossing op in de spuit. Om te vermijden dat u lucht inspuit, moet aan de punt van de naald eerst een druppel glucagon verschijnen wanneer u de spuit verticaal met de naald omhoog houdt.



4. Injecteer de volledige dosis in de spieren van de dij.
Kinderen minder dan 25 kg of jonger dan 6-8 jaar: een halve flacon!

Wat doen na de inspuiting?

- Indien de persoon met diabetes reageert op GlucaGen® en opnieuw bij bewustzijn komt, is de inname van glucose (suikers) via orale weg aangewezen om het heroptreden van een hypoglycemie te vermijden.
- Indien de persoon met diabetes niet binnen 10 minuten reageert op GlucaGen®, verwittig de hulpdiensten.
- Alle patiënten die een ernstige hypoglycemie doormaken dienen een arts te raadplegen.

GlucaGen® Hypokit

GlucaGen® Hypokit bevat een flesje met glucagonpoeder en een voorgevulde spuit met steriel water en is te **bewaren op kamertemperatuur (max. 25°C) gedurende 18 maanden of in de koelkast gedurende 3 jaar** (zie vervaldatum op de verpakking: EXP). De spuit moet vlak vóór de toediening worden klaargemaakt, want het glucagonpoeder is niet houdbaar éénmaal opgelost in de vloeistof.

